

Nux vomica- Homaccord®

injekcinis tirpalas

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Biologische Heilmittel Heel GmbH,

Dr. Reckeweg Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Vokietija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Nux vomica-Homaccord, injekcinis tirpalas

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje 5 ml (= 5 g) ampulėje yra šių medžiagų: **Veikliųjų medžiagų:**

Strychnos nux-vomica Dil. D4 10 mg, Strychnos nux-vomica Dil. D10 10 mg,

Strychnos nux-vomica Dil. D15 10 mg, Strychnos nux-vomica Dil. D30 10 mg,

Strychnos nux-vomica Dil. D200 10 mg, Strychnos nux-vomica Dil. D1000 10 mg,

Bryonia Dil. D4 10 mg, Bryonia Dil. D6 10 mg, Bryonia Dil. D10 10 mg, Bryonia Dil.

D15 10 mg, Bryonia Dil. D30 10 mg, Bryonia Dil. D200 10 mg, Bryonia Dil. D1000

10 mg, Lycopodium clavatum Dil. D5 15 mg, Lycopodium clavatum Dil. D10 15

mg, Lycopodium clavatum Dil. D30 15 mg, Lycopodium clavatum Dil. D200 15 mg,

Lycopodium clavatum Dil. D1000 15 mg, Citrullus colocynthis Dil. D5 15 mg,

Citrullus colocynthis Dil. D10 15 mg, Citrullus colocynthis Dil. D30 15 mg, Citrullus

colocynthis Dil. D200 15 mg.

pagalbinių medžiagų: 1–22 komponentai yra per paskutiniai 2 lygiai sustiprinami kartu. Kiti ingredientai: Natrio chloridas, injekcinis vanduo.

4. INDIKACIJA (-OS)

Virškinimo trakto ir kepenų sistemos sutrikimai, virškinimo trakto spazminiai procesai su neramumu, diegliai, ūminis ir lėtinis gastroenteritas, vidurių užkietėjimas spazmais, meteorizmas.

5. KONTRAINDIKACIJOS. Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinomos. Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina pranešti veterinarijos gydytojui.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Žirgas, galvijai, kiaulės, avys, ožkos, šunys, katės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Skirta po oda, į raumenis ar į veną.

Priklausomai nuo gyvūnų rūšies ir kūno svorio, vienkartinė dozė per dieną yra:

Arkliai, galvijai, kiaulės: 5 ml

Paršeliai: 2-3 ml

Avis, ožkos: 2 ml

Didelis šuo: 3-4 ml



Vidutinis šuo: 2 ml

Mažas šuo, katė: 1-2 ml

Šuniukai: 0,5-1 ml

Esant ūmiems nusiskundimams, nurodytą vienkartinę dozę iš pradžių galima pakartoti po 24 valandų. Jei yra polinkis į atkrytį ar lėtines ligas, vienkartinę dozę reikia vartoti kas 4 dienas. Vaisto vartojimo trukmė priklauso nuo esamo klinikinio vaizdo ir jį nustato veterinarijos gydytojas.

Stiklinės ampulės atidarymo instrukcija



Ampulės įpjauti nereikia. Ampulę laikyti spalvotu tašku į viršų ir pakreipus kampų. Pirštu pastuksenti arba pakratyti ampulę, kad tirpalas subėgtų į apatinę jos dalį. Nulaužti ampulės viršūnę spaudžiant žemyn nuo spalvoto taško. Ampulėje likusį nesunaudotą vaistą reikia išmesti.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO. Nėra.

10. IŠLAUKA. Išlauka: 0 parų

11. SPECIALIOS LAIKYMO NURODYMAI. Saugoti nuo vaikų.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI. Nėra.

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS. Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO PATVIRTINIMO DATA. 02/2012

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama be veterinarinio recepto.

Farmakoterapinė grupė: homeopatinis veterinarinis vaistas.

Norint gauti informaciją apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtoju vietiniu atstovu.

UAB „Biomedela“

Studentų g. 25 50239 Kaunas

Mob. 8 656 60 130

El. paštas info@biomedela.com