




SUC terapija

Sprendimas šunų ir kačių inkstų nepakankamumo problemai spręsti!

INKSTŲ FUNKCIJOS NEPAKANKAMUMO STADIJOS

1 STADIJA **2** STADIJA **3** STADIJA **4** STADIJA



100% - 33% funkcionalumas

33% - 25% funkcionalumas

25% - 10% funkcionalumas



10% - 0% funkcionalumas

LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI	IRIS ¹ ETAPAI	TERAPIJA	KLINIKINIAI SIMPTOMAI
Kreatinino koncentracija kraujyje < 125 μmol/L < 1,4 mg/dL	1 33% inkstų funkcija	1 x SUC* per savaitę	Keletas klinikinių simptomų: • Galimas apetito pokytis • Dienos vandens kiekio suvartojimo pokytis
Kreatinino koncentracija kraujyje 125–180 μmol/L 1,4–2,0 mg/dL	2 25% inkstų funkcija	2 x SUC* per savaitę	Žemo laipsnio klinikiniai simptomai, pvz.: • Nuovargis • Apetito stoka • Polidipsija / poliurija
Kreatinino koncentracija kraujyje 181–440 μmol/L 2,10–5,0 mg/dL	3 10% inkstų funkcija	3 x SUC* per savaitę	Vidutiniai klinikiniai simptomai, pvz.: • Letargija • Svorio netekimas • Retkarčiais vėmimas • Gastritas • Stomatitas
Kreatinino koncentracija kraujyje > 440 μmol/L > 5,0 mg/dL	4	4 x SUC* per savaitę	Sunkūs klinikiniai simptomai, pvz.: • Anoreksija • Vėmimas • Kacheksija • Mieguistumas iki ureminės komos

* SUC derinys s.c. / per os (Solidago compositum ad us. vet., Ubichinon compositum ad us. vet., Coenzyme compositum ad us. vet.)

¹ IRIS: Tarptautinė inkstų interesų draugija 2015 m.

SUC PREPARATŲ NAUDOJIMO BŪDAI



Dėmesio!

SUC gydymo schema lengvai derinama su kitais medikamentais ir (arba) spec. inkstų dieta.

- Atidarykite po vieną reikiamo preparato ampulę:
 - Solidago compositum ad us. vet.
 - Ubichinon compositum ad us. vet.
 - Coenzyme compositum ad us. vet.
- Iš kiekvienos ampulės ištraukite reikiamą ml kiekį į švirkštą.
- Naudojimo būdas:
 - tiesiogiai per burną arba per maistą,
 - švirkšti po oda.

SUC PREPARATŲ DOZAVIMAS

	Injekcinis tirpalas
 Mažam šuniui iki 15 kg	1-2 ml 1 kartą per dieną
 Vidutiniam šuniui 15-25 kg	2 ml 1 kartą per dieną
 Dideliam šuniui per 25 kg	3-4 ml 1 kartą per dieną
 Katėms	1-2 ml 1 kartą per dieną

Sergantiems lėtinėmis ligomis ar joms kartojantis galima naudoti kas 4 d. Prieš naudojimą perskaitykite informacinį lapelį.

SUC TERAPIJOS PRODUKTAI

Solidago compositum
2,2 ml/N10



Paskirtis

Ūminėms ir lėtinėms šlapimo takų ligoms (cistitui, nefritui, nefrolitiazai) ar esant inkstų nepakankamumui).

Ubichinon compositum
2,2 ml/N10



Paskirtis

Atkurti ląstelių metabolizmą, ypač sergant lėtinėmis ar degeneracinėmis ligomis ir esant navikams.

Coenzyme compositum
5 ml/N5



Paskirtis

Medžiagų apykaitos sutrikimams, fermentams aktyvinti sergant degeneracinėmis ligomis, sutrikus fermentų veiklai, gerinti deguonies pasisavinimą, sergant medžiagų apykaitos, sekinančiomis ligomis, lėtine egzema.