

Solidago compositum

injekcinis tirpalas

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Biologische Heilmittel Heel GmbH,
Dr. Reckeweg Str. 2-4
76532 Baden-Baden, Vokietija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Solidago compositum, injekcinis tirpalas

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje 2,2 ml (= 2,2 g) ampulėje yra 22 mg kiekvienos iš šių medžiagų:

Veikliųjų medžiagų: Acidum arsenicosum D12, Apisinum D8, Argentum nitricum D6, Baptisia tinctoria D4, Barosma D8, Berberis vulgaris D4, Capsicum annum D6, Chondrodendron D6, Cuprum sulfuricum D6, Equisetum hiemale D4, Hepar sulfuris D10, Hydrargyrum bichloratum D8, Lytta vesicatoria D6, Natrium pyruvicum D10, Orthosiphon aristatus D6, Pyelon suis D10, Smilax D6, Solidago virgaurea D4, Terebinthina larinica D6, Ureter suis D10, Urethra suis D10, Vesica urinaria suis D8.

Pagalbinių medžiagų: Natrio chloridas, injekcinis vanduo; 96% etanolio, 85% glicerolio ir laktozės monohidrato pėdsakai.

4. INDIKACIJA (-OS)

Ūminės ir lėtinės šlapimo takų ligos (visos tikslinės rūšys, išskyrus dekoratyvinius paukščius), pvz. Cistitas; palaikanti ūminės ir lėtinės inkstų ligos (visos tikslinės rūšys), pvz. nefritas, nefrolitiazė ar inkstų nepakankamumas.

5. KONTRAINDIKACIJOS. Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS. Nežinomos. Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina pranešti veterinarijos gydytojui.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Arkliai, galvijai, kiaulės, avys, ožkos, šunys, katės, triušiai, graužikai, dekoratyviniai paukščiai.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Skirta po oda, į raumenis ar į veną.

Priklausomai nuo gyvūnų rūšies ir kūno svorio, vienkartinė dozė per dieną yra:

Arkliui, galvijui (virš 500 kg): 10 ml

Arkliui, galvijui (iki 500 kg): 5 ml

Paršeliui: 3–5 ml

Aviai, ožkai: 3–4 ml

Dideliam šuniui (virš 25 kg): 3–4 ml




Vidutinio dydžio šuniui (15-25 kg): 2 ml

Mažam šuniui (iki 15 kg), katė: 1-2 ml

Triušiu, mažam graužikui, dekoratyviniam paukščiui: 0,1–0,5 ml

Esant ūmiems nusiskundimams, nurodytą vienkartinę dozę iš pradžių galima pakartoti po 24 valandų. Jei yra polinkis į atkrytį ar lėtines ligas, vienkartinę dozę reikia vartoti kas 4 dienas. Vaisto vartojimo trukmė priklauso nuo esamo klinikinio vaizdo ir jį nustato veterinarijos gydytojas.

Instrukcija ampulės atidarymui:



Atsargiai atidarykite ampulę! Vykdykite instrukcijas.

Nebūtina matyti atidarytos stiklinės ampulės. Laikykite ampulę pakreipta galva į viršų ir leiskite tirpalui tekėti žemyn, bakstelėdami ar purtant. Tada nubraukite ampulės galvutę, spausdami spalvos tašką. Atidarytas ampules reikia išmesti.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Nėra.

10. IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Saugoti nuo vaikų.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Nėra.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

07/2013

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama be veterinarinio recepto.

Farmakoterapinė grupė: homeopatinis veterinarinis vaistas.

Norint gauti informaciją apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.

UAB „Biomedela“

Studentų g. 25, 50239 Kaunas

Mob. tel. 8 656 60 130

El. paštas info@biomedela.com